

روشهای تشخیص:

تشخیص عفونت براساس علائم و آزمایشات انجام شده فرد می باشد، یک نمونه ادرار جهت بررسی از نظر باکتری و چرک از فرد گرفته می شود. اگر عفونت همچنان پایدار و یا علائمی از عفونت بعد از درمان وجود داشته باشد این آزمایشات ممکن است انجام بگیرد. (۱) پیلوگرافی داخل وریدی (۲) اسکن اولتراسوند (۳) سیستوسکوپی

عوارض عفونت ادراری:

باعث آسیب دیدگی دائمی کلیه می شود.
درمان: درمان ایده آل برای عفونت دستگاه ادراری استفاده از آنتی بیوتیک ها می باشد که نیاز به مصرف ۷-۵ روز آنتی بیوتیک دارد.

عفونت دستگاه ادراری کودکان:

عفونت دستگاه ادراری به معنای عفونت در هر یک از قسمت های ادراری از جمله کلیه ها، مجرای ادراری و عفونت مثانه می باشد. اکثر انواع عفونت های ادراری شامل قسمت پائین دستگاه ادراری یعنی عفونت مثانه و بیشابراه می باشد.

عوامل خطر برای عفونت مجرای ادراری:

۱- انسداد مجرای ادراری مثل سنگ کلیه ۲- شرایط مساعد کننده مثل تضعیف سیستم ایمنی بدن ۳- اگر ادرار در مثانه باقی بماند

علائم عفونت های دستگاه ادراری:


نشانه های عفونت ادراری می تواند شامل تب، اسهال، استفراغ، مکرر ادرار و درد و سوزش در هنگام دفع ادرار باشد.



دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بیمارستان حضرت ولیعصر ارسنجان

عفونت دستگاه ادراری کودکان



نویسنده مدرک	ملیحه کشاورز/کارشناس پرستاری
تایید کننده علمی	دکتر شهریاری /متخصص اطفال
تاریخ تهیه	بهار ۱۴۰۲
منبع	کتاب پرستاری برونر سوارث
کد سند	Pa-B1-21/01

راه های پیشگیری:

- ۱- هنگام حمام کردن کودکی حتی الامکان از وان استفاده نشود و به جای آن از دوش استفاده شود.
- ۲- در کودکان مذکر که ختنه نشده اند پوست ... باید حتی الامکان تمیز شود.
- ۳- به جای استفاده از شورت های پلاستیکی از شورت های پنبه ای استفاده شود.
- ۴- در صورتی که کودک برای استفاده از لگن تعلیم یافته است باید توصیه شود از نگهداری ادرار در مثانه خودداری کرده و حداقل ۴ بار در روز باید مثانه به طور کامل تخلیه گردد.
- ۵- نوزادان پسر باید به موقع ختنه شود
- ۶- از پوشاندن لباس تنگ و بستن محکم پوشک خودداری کنید.

۷- پوشک کودک زود عوض شود و حتی الامکان خشک نگه داشته شود.

۸- در صورت بی قراری کودک اشکال در ادرار کردن - احساس بدی به ادرار کردن به پزشک مراجعه کنید.

رژیم غذایی:

- ۱- دادن مایعات فراوان به کودک جهت رقیق شدن ادرار.
- ۲- دادن استراحت کافی
- ۳- دادن داروی تجویزی به طور کامل