

مشابه خودتان تجویز نکنید.

• داروی دفریپرون را بیش از دوز تجویز شده توسط

پزشک ، مصرف نکنید.

• تداخل دارویی دفریپرون را چک کنید و حتماً به

پزشکتان، اطلاع دهید که در حال مصرف چه داروی

دیگری هستید.

### تداخل دارویی دفریپرون

تداخل دارویی ممکن است عملکرد داروها را تغییر و

خطر ابتلا به عوارض جانبی جدی را افزایش دهد. یک

لیست از تمام داروهایی (از جمله داروهای با نسخه /

بدون نسخه و محصولات گیاهی) داروی آنتی‌اسید و یا

داروی حاوی سایمتیکون مانند آلومینیوم ام جی اس) که

استفاده می‌کنید تهیه کرده و آن را با دکتر و داروساز

خود به اشتراک بگذارید. دوز دارو مصرفی خود را بدون

مشورت با دکتر خود تغییر نداده و یا مصرف دارو را ترک

نکنید.

### کاربرد

اضافه بار آهن در بیماری مانند تالاسمی ماژور

اطلاعات داروها : تالاسمی یک بیماری ژنتیکی است که خون را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در تالاسمی، مولکولی به نام هموگلوبین دچار نقص ساختاری می‌شود. هموگلوبین بخشی از سلول‌های قرمز خونی است که اکسیژن را حمل کرده و عامل قرمز بودن خون است. به دلیل تغییرات ژنتیکی میزان هموگلوبین‌های نرمال خون کاهش می‌یابد و فرد دچار آنمی می‌شود. برخی از افراد مبتلا برای درمان این نوع عارضه نیاز به دریافت خون دارند. به دلیل دریافت مکرر خون در این بیماری ممکن است آهن مازاد در بدن ذخیره شود. دفریپرون یک داروی شلاته‌کننده آهن است که آهن مازاد را از بدن دفع می‌کند. دفریپرون آهن را به صورت کمپلکس در می‌آورد و آن را دفع می‌کند.

### موارد منع مصرف داروی دفریپرون

• به تاریخ انقضا داروی دفریپرون توجه کنید و اگر

دارویی که در دستتان است تاریخ انقضای آن تمام شده

است، از آن مصرف نکنید.

• هرگز داروی دفریپرون را به کس دیگری حتی با علائم



دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بیمارستان حضرت ولیعصر ارسنجان

### داروی دفریپرون



نویسنده مدرک	منصوره اسکندری / کارشناس پرستاری
تأیید کننده علمی	دکتر پناهی / متخصص داخلی
تاریخ تهیه	بهار ۱۴۰۳
منبع	کتاب پرستاری برونر سوارث
کد سند	Pa-B1-121/01

نکاتی که قبل از مصرف دفریپرون باید در نظر گرفته شود

بعضی داروها را نمی توان در بعضی از شرایط تجویز نمود و بعضی داروها نیز در صورتی که نیاز به درمان تکمیلی باشد تجویز می گردد. بنابراین بهتر است که قبل از مصرف داروی دفریپرون ، پزشکتان از موارد زیر مطلع باشد :

• تمام داروها در کنار تأثیرات مثبتشان، می توانند مسبب عوارض ناخواسته در صورت حاملگی و یا در صورتی که به نوزاد خود شیر می دهید.

• در صورتی که مشکلات کبدی و یا کلیوی دارید.

• در صورتی که تعداد گلبول های سفیدتان کمتر از حد نرمال است.

• اگر از سایر داروها استفاده می کنید. این داروها شامل تمام داروهای در دسترس است، چه برایتان تجویز شده است و چه بدن تجویز پزشک آن را مصرف می کنید نظیر

داروهای گیاهی و داروهای مکمل.

• اگر نسبت به دارویی آلرژی و حساسیت داشته اید.

### عوارض جانبی احتمالی داروی دفریپرون

تمام داروها در کنار تأثیرات مثبتشان، می توانند مسبب

عوارض ناخواسته ای در بدن شوند. هر چند که این

عوارض در همه افراد به وجود نمی آید. اگر پس از دریافت

دارو تغییری منفی در وضعیت سلامتی شما پدید آمد

بهتر است که با پزشک خود مشورت نمایید. بسیاری از

عوارض ممکن است با علائم سایر بیماری مشابهت داشته

باشد.

• احساس کسالت، شکم درد: دارو را پس از صرف غذا

میل نمایید.

• ادرار قهوه ای یا قرمز: این مورد مشکل ساز نیست.

• سردرد: از پزشکتان بخواهید که یک مسکن مناسب

تجویز نماید.

• اسهال: آب فراوان بنوشید تا آب از دست رفته تأمین

شود.

• خستگی، افزایش اشتها: در صورت آزار دهنده شدن با

پزشک خود مشورت نمایید.

نکته مهم: از دیگر عوارض جانبی داروی دفریپرون

می توان به کاهش تعداد گلبول های سفید و افزایش

آنزیم های کبدی اشاره نمود. پزشک به صورت روتین

تست های خونی را بررسی خواهند نمود. اما اگر دچار تب،

علائم آنفولانزا نظیر گلو درد در اسرع وقت به پزشک

اطلاع دهید.

### نحوه نگهداری داروی دفریپرون

• دارو را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

• دارو را در جایی خشک و خنک و به دور از گرما و تابش

نور مستقیم نگه دارید.