




دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بیمارستان حضرت ولیعصر ارسنجان

حاملگی خارج از رحم



تعریف:

حاملگی خارج از رحم یک اختلال باروری است که در نتیجه رشد جنین در هر قسمتی از سیستم تناسلی به جز لایه های داخلی دیواره رحم ایجاد می گردد.

قسمت اعظم این نوع از حاملگی در لوله های رحمی اتفاق افتاده که حاملگی لوله ای نامیده می شود.

این نوع حاملگی می تواند در مکان هایی مانند تخمدان ها، دهانه رحم و حتی شکم رخ دهد.

از هر ۵۰ حاملگی ۱ مورد احتمال بروز حاملگی خارج از رحم وجود دارد.

حاملگی خارج از رحم یکی از علت های اصلی مرگ مادر در ۳ ماهه اول بارداری محسوب می شود.

عوامل خطر:

هرگونه دستکاری و اختلال در بافت های لوله رحمی می تواند زمینه را جهت حاملگی خارج از رحم فراهم کند.

سابقه اعمال جراحی زنان بر روی لوله ها می تواند باعث ایجاد اختلال در بافت شده و منجر به حاملگی خارج از رحم گردد.

پس از ابتلا به یک مورد حاملگی نابجا، احتمال ابتلا به این گونه حاملگی در بارداری های بعدی ۱۰٪ افزایش می یابد.

خودناباروری و استفاده از روش های کمک باروری سبب افزایش چشمگیر خطر حاملگی خارج از رحمی می شود.

عفونت ها از طریق تخریب و انسداد لوله های رحمی باعث حاملگی نابجا می شود.

در حالت طبیعی لوله های رحمی توسط سلول های مویی شکلی پوشیده شده است که این سلول ها نقش مهمی در انتقال سلول تخم دارند. در صورت تخریب آن ها به وسیله عفونت انتقال تخم صورت نگرفته و حاملگی طبیعی اتفاق نمی افتد.

همچنین انسداد لوله های رحمی می تواند از حرکت تخم به سمت رحم جلوگیری کند.

نمی افتد.

سمت رحم جلوگیری کند.

نویسنده مدرک	صدیقه رحیمی / کارشناس مامایی
تایید کننده علمی	دکتر بدیعی / متخصص زنان و زایمان
تاریخ تهیه	بهار ۱۴۰۳
منبع	کتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد ۱
کد سند	Pa-B۴-۱۰۳/۰۱

مصرف قرص‌های پروژسترونی، استفاده از IUD، استعمال دخانیات و داشتن چندین شریک جنسی باعث افزایش این نوع حاملگی خواهد شد.

علائم و نشانه‌ها:

حاملگی خارج از رحمی در بیشتر موارد خود را با علامت درد لگنی و شکمی و تندرns در این نواحی نشان می‌دهد. خونریزی غیرطبیعی رحمی، عدم قاعدگی و حساسیت شکم، ضعف و بی‌حالی شدید، افت فشار خون از دیگر علائم این گونه حاملگی است.

تشخیص:

تشخیص این نوع حاملگی اصولاً از روی علائم بالینی، تست آزمایشگاهی، سونوگرافی، و در مراحل آخر بازشدن شکم توسط عمل جراحی و مشاهده اجزای داخل شکم توسط لاپاراسکوپی می‌باشد.

درمان:

در مواردی که پارگی اعضاء داخل لگن رخ دهد خونریزی داخلی ممکن است منجر به شوک شود که از علائم اولیه آن درد شدید لگنی، حساسیت شکمی، افت سریع فشار خون و نبض، تهوع می‌باشد که درمان عمل جراحی اورژانسی و بازکردن شکم است.

در موارد غیر اورژانسی:

لاپاراتومی کوچک و لاپاراسکوپی درمان ارجح است. در درمان دارویی از متوتروکسات استفاده می‌گردد که باید بیمار تحت نظر کامل باشد